

Na tropie ssaków Ameryki Północnej

Zając wielkouchy (*Lepus californicus*)

– ang. *Black-tailed Jackrabbit*



Ssak z rodziny zającowatych. Prowadzi nocny tryb życia. Żyje w stadach. Roślinożerca. Młode, w przeciwieństwie do młodych królika, widzą od urodzenia, są bardziej samodzielne i stosunkowo szybko opuszczają gniazdo. Budowa ciała zająca wielkouchego umożliwia mu szybkie poruszanie się. Nogi są długie i smukłe, biegnąc uderza podłoża tylko czubkami łap, co sprawia, że jego tropy są bardzo charakterystyczne i co umożliwia zwierzęciu osiągnięcie prędkości nawet 35 mil na godzinę.

Wygląd: Długość ciała 22-24 cale, waga 2-4 funtów. Sierść szarobrazowa, nogi bardzo długie i duże, czubki uszu czarne. Górna część ogona czarna.

Występowanie: Równiny i łąki zachodniej i południowo-zachodniej części USA.

Oznaki pobytu: Tropy długie na 2-3 cale, z mniej widocznym niż u królika „odbiciem pięty”. Przednie tropy mniejsze i bardziej zaokrąglone, znajdują się za tylnymi, jeśli zostawiane są przez biegnące zwierzę. Zając pozostawia sieć tropów pomiędzy miejscami żerowania a odpoczynku. Spotkać go można w zaroślach, w niewielkich zagłębieniach terenu. Odchody w kształcie kulek.



Oznaki pobytu

Zając „szarak” (*Lepus townsendii*)

– ang. *White-tailed Jackrabbit*

Ssak z rodziny zającowatych, północny kuzyn zająca wielkouchego. Prowadzi nocny tryb życia. Zamieszkuje tereny, które w okresie zimowym pokryte są śniegiem. Biała szata zimowa sprawia, że trudno go dostrzec na śniegu. Jest szybszy od swego kuzyna, może poruszać się z prędkością nawet 45 mil na godzinę. Te dwa zające można często spotkać razem w północnych częściach terenów zamieszkiwanych przez zająca wielkouchego, jednak obszar występowania zająca „szaraka” sięga obszarów górzystych. Duże uszy pomagają w regulacji temperatury ciała – odprowadzają ciepło, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, są również doskonałymi „wykrywaczami” zbliżających się drapieżników.

Wygląd: Długość ciała 23-25 cali. Duży, szarobrazowy zając. Nogi bardzo długie i duże, czubki uszu czarne. Ogon biały. Zimą sierść zmienia barwę na białą lub jasnoszarą.

Występowanie: Tereny trawiaste i krzaczaste równiny stanów Washington, Oregon, California po Północne Wielkie Równiny, Minnesotę, Wisconsin i Iowa.

Oznaki pobytu: Tropy, odchody i inne oznaki pobytu podobne jak u zająca wielkouchego.

